



PHARMAZAND
Pharmaceutical Co.
شرکت داروسازی فارمازند

VADEMECUM

دارونامه

About

PHARMAZAND



PHARMAZAND

Pharmaceutical Co.

شرکت داروسازی فارمازند

ضد انگل و ضد عفونی کننده می باشد. خطوط تولید شرکت با به کارگیری تکنولوژی های بروز دنیا و امکانات مختلف، یکی از بروزترین خطوط تولید کشور می باشد که برخی از امکانات آن عبارتند از:

- به کارگیری سیستم های هوشمند کنترل نور در فضاهای تولید جهت کاهش اتلاف انرژی
- استفاده از سیستم های کنترل دما، رطوبت، فشار با کمک PLC

- استفاده از مجهزترین سیستم های هوا ساز جهت تامین هوای فضاهای تولید. (بخش آزمایشگاهی این واحد بر اساس استانداردهای لازم جهت احراز گواهی آزمایشگاه مرجع مجهز به تجهیزات نظیر GC و HPLC و... می باشد.)

شرکت داروسازی فارمازند یکی از نخستین شرکت های تولید داروهای دام و طیور در ایران است که از سال ۱۳۶۷ با همت جمعی از داروسازان و متخصصین این صنعت تاسیس گردید و با تلاش و پیگیری مستمر و شبانه روزی، در طول بیش از ۳۰ سال دوران فعالیت خود توانسته بخشی از نیاز بازار به داروهای دام و طیور کشور را تامین نماید. کارخانه فارمازند دارای مساحت ۱۳۵۰۰ متر مربع و بنای مفید ۳۴۰۰ متر مربع می باشد.

فضای تولیدی کارخانه فارمازند شامل ۵ واحد جداگانه برای تولید اشکال مختلف دارویی از جمله پودر و محلول به صورت خطوط مجزا جهت تولید انواع آنتی بیوتیک، ویتامین، ضد کوکسیدیوز،

گواهینامه های اخذ شده

- دریافت گواهینامه GMP از شرکت ACS کانادا
- استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و اخذ گواهینامه مربوطه از شرکت ACS کانادا
- اخذ گواهینامه GMP از سازمان دامپزشکی کشور



Product List

APRAZAND
 COLISTIZAND 2
 COLISTIZAND 3
 DOXYZAND 10
 DOXYZAND 50
 ENROZAND
 ERYTHROZAND
 FLORZAND
 FOSFOZAND
 LINCOFEEDOZAND
 METHOXIZAND
 NEOZAND
 OXYZAND 50
 SPECTINOZAND
 TIAMOZAND
 TILMOZAND
 TYLOZAND
 TYLOZAND 10
 TYLOZAND 25

آپرازند
 کلیستی زند ۲
 کلیستی زند ۳
 داکسی زند ۱۰
 داکسی زند ۵۰
 انروزند
 اریتریزند
 فلورزند
 فسفوزند
 لینکوفیدوزند
 متوکسی زند
 نئوزند
 اکسی زند ۵۰
 اسپکتینوزند
 تیاموزند
 تیلموزند
 تایلوزند
 تایلوزند ۱۰
 تایلوزند ۲۵

Antibiotics آنتی بیوتیک ها

ALFAZAND
 AMINOZAND
 B.K ZAND
 B VITAZAND
 C ZAND
 CARNOZAND
 DECIZAND
 DECIKAZAND
 ELECTROZAND
 LIPOZAND
 MULTIZAND

آلفازند
 آمینوزند
 بی کازند
 بی ویتازند
 سی زند
 کارنوزند
 دسی زند
 دسی کازند
 الکتروزند
 لیپوزند
 مولتی زند

Vitamins ویتامین ها

AMPROZAND
 AMPROZAND PLUS
 AMPROZAND-S
 DICLAZAND
 MADUCARBAZAND
 MADURAZAND
 MONENSOZAND
 SALINOZAND
 TOLTRAZAND

آمپروزند
 آمپروزند پلاس
 آمپروزند اس
 دیکلازند
 مادو کاربازند
 مادورازند
 موننسوزند
 سالینوزند
 تولترازند

Anticoccidiosis ضد کوکسیدیوزها

ASPIRAZAND
 BETA POWERZAND
 BRONCOZAND
 CALMOZAND
 ORSOZAND
 PARAFFIN

اسپیرازند
 بتا پاورزند
 برونکوزند
 کالموزند
 اوسوزند
 پارافین

Supportives کمک درمان ها

LEVOZAND 7.5
 LEVOZAND 10

لووزند ۷/۵
 لووزند ۱۰

Anthelmintics ضد انگل ها

ANTIBIOTICS

-  APRAZAND
-  COLISTIZAND 2
-  COLISTIZAND 3
-  DOXYZAND 10
-  DOXYZAND 50
-  ENROZAND
-  ERYTHROZAND
-  FLORZAND
-  FOSFOZAND
-  LINCOFEEDOZAND
-  METHOXIZAND
-  NEOZAND
-  OXYZAND 50
-  SPECTINOZAND
-  TIAMUZAND
-  TILMOZAND
-  TYLOZAND
-  TYLOZAND 10
-  TYLOZAND 25

APRAZAND

Apramycin 50%
(W.S.P)



آپرازند

پودر محلول در آب آپرامایسین ۵۰٪

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک
- شرایط نگهداری:** در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.
- زمان پرهیز از مصرف:**
گوساله و بره: ۲۸ روز
طیور: ۷ روز
- موارد منع مصرف:** در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، منع مصرف دارد.
- موارد احتیاط:** لوله‌های آبخوری جهت جلوگیری از افت اثر دارو باید عاری از زنگ زدگی باشند. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- بسته بندی:** ساشه‌های چند لایه آلومینیومی ۱۰۰ گرمی

- ترکیب:** هر ساشه ۱۰۰ گرمی حاوی ۵۰ گرم آپرامایسین بصورت ملح سولفات می‌باشد.
- موارد مصرف:** آپرامایسین به صورت خوراکی برای درمان عفونت‌های گوارشی و تنفسی مانند کلی باسیلوز و سالمونلوز در طیور، گوساله‌ها و بره‌ها تجویز می‌گردد.
- مقدار و نحوه مصرف:**
گوساله: ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم آپرامایسین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یا ۴۰ تا ۸۰ میلی گرم آپرازند برای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۵ روز متوالی
بره: ۱۰ میلی گرم آپرامایسین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یا ۲۰ میلی گرم آپرازند برای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ تا ۵ روز
طیور: ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم آپرامایسین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن یا ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم آپرازند برای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۷ روز (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم آپرازند در هر هزار لیتر آب آشامیدنی)

Composition: Each gram of Aprazand contains 500 mg Apramycin sulfate.

Indications: Aprazand is indicated for treatment of gastro-intestinal and respiratory infections like colibacillosis and salmonellosis in poultry, calves and lambs.

Dosage and administration:

For oral administration via drinking water;

- Poultry: 25 to 50 mg of Apramycin per kg of body weight (BW) Eq. to 50 to 100 mg of Aprazand per kg BW or 0.5 to 1 g of Aprazand in 1 liter of drinking water for 7 days.
- Calves: 40 to 80 mg/Kg BW Aprazand for 5 days
- Lambs: 20 mg/kg BW Aprazand for 3 to 5 days

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Poultry: 7 days

Calves and Lambs: 28 days

Contra-indications: Do not administer in commercial layers which their eggs used by human.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 100 gram multilayer aluminium foil sachet.

COLISTIZAND 2

Colistin sulphate 2 M.I.U.
(Oral Solution)



کلیستی زند ۲

محلول خوراکی کلیستین سولفات ۲ میلیون واحد بین المللی

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۲ روز

تخم مرغ: ۵ روز

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی کلیستی زند ۲ حاوی ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی کلیستین، بصورت ملح سولفات می‌باشد.

موارد مصرف: کلیستی زند ۲ جهت درمان عفونت‌های روده‌ای ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر باکتری‌های گرم منفی در طیور، گوساله و بره به کار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۲۵۰ میلی لیتر کلیستی زند ۲ در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

گوساله و بره: ۰/۲۵ میلی لیتر کلیستی زند ۲ به ازای ۱۰ کیلوگرم وزن زنده، ۲ بار در روز به مدت ۳ تا ۴ روز - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter Colistizand 2 contains 2.000.000 I.U Colistin (as sulphate).

Indications: Colistizand 2 is indicated for treatment of intestinal infections due to E.coli, Salmonella and other gram negative bacteria in poultry, calf and lamb.

Dosage and administration:

Poultry: 250 ml of Colistizand 2 in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

Calf and lamb: 0.25 ml of Colistizand 2 per 10 kg of body weight, twice daily for 3-4 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time:

Meat: 2 days

Egg: 5 days

Contra-indications: Nil

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

COLISTIZAND 3

Colistin sulphate 3 M.I.U.
(W.S.P)



کلیستی زند ۳

پودر محلول در آب کلیستین سولفات ۳ میلیون واحد بین المللی

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۲ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

موارد منع مصرف: ندارد

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه های چند لایه آلومینیومی ۱۰۰ گرمی

ترکیب: هر گرم کلیستی زند ۳ حاوی ۳ میلیون واحد بین المللی کلیستین، بصورت ملح سولفات می باشد.

موارد مصرف: کلیستی زند ۳ برای درمان عفونت های روده ای ناشی از اشریشیاکلی، سالمونلا و سایر باکتری های گرم منفی در طیور به کار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

محلول در آب آشامیدنی : ۱۰۰ گرم کلیستی زند ۳ در ۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ تا ۷ روز
مخلوط در دان : ۱۰۰ گرم کلیستی زند ۳ در ۲۵۰ کیلوگرم دان به مدت ۵ تا ۷ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each gram of Colistizand 3 contains 3.000.000 I.U. Colistin. (as sulphate)

Indications: Colistizand 3 is indicated for treatment of intestinal infections due to E.coli, Salmonella and other gram negative bacteria in poultry.

Dosage and administration:

100 gram Colistizand 3 in 500 liters of drinking water or

100 gram Colistizand 3 in 250 kg of feed for 5-7 days

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Meat: 2 days

Contra-indications: Nil

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 100 gram multilayer aluminium foil sachet.

DOXYZAND 10

Doxycycline 10%
(Oral Solution)



داکسی زند ۱۰

محلول خوراکی داکسی سایکلین ۱۰٪

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان داکسی زند ۱۰ با آمینوگلیکوزیدها و داروهای محتوی کلسیم، منیزیم و آهن پرهیز شود.

هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی داکسی زند ۱۰ حاوی ۱۰۰ میلی گرم داکسی سایکلین به صورت ملح هیکلات است.

موارد مصرف: داکسی زند ۱۰ جهت درمان CRD ناشی از مایکوپلاسما، کلی باسیلوز، پاستورلوز، سالمونلوز، ورم روده نکروتیک، عفونت کیسه های هوایی و عفونت های استافیلوکوکی به کار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی: ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معادل ۰/۵ تا ۱ لیتر داکسی زند ۱۰ در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Doxyzand 10 contains 100 mg Doxycycline (as hyclate).

Indications: Doxyzand 10 is indicated for treatment of CRD, Colibacillosis, Pasteurellosis, Salmonellosis, Necrotic enteritis, Air sacculitis and Staphylococcal infections.

Dosage and administration:

Broiler: 20 mg per kg BW equivalent to 0.5-1 liter Doxyzand 10 in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.
- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Broilers: 5 days.

Contra-indications: Do not use Doxyzand 10 while using aminoglycosides and products containing calcium, magnesium and iron.

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

DOXYZAND 50

Doxycycline 50%
(W.S.P)



داکسی زند ۵۰

پودر محلول در آب داکسی سایکلین ۵۰٪

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی ۴ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان داکسی زند ۵۰ با آمینوگلیکوزیدها و داروهای محتوی کلسیم، منیزیم و آهن پرهیز شود.

هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت های چند لایه آلومینیومی ۱ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم داکسی زند ۵۰ حاوی ۵۰۰ میلی گرم داکسی سایکلین به صورت ملح هیکلرات می باشد.

موارد مصرف: داکسی زند ۵۰ جهت درمان کلی باسیلوز، CRD، پاستورلوز، ورم روده نکروتیک، کوریزای عفونی، عفونت کیسه های هوایی، سالمونلوز و عفونت های استافیلوکوکی کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی: ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معادل ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم داکسی زند ۵۰ در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی بمدت ۴ تا ۷ روز

گوساله و گوسفند: ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معادل ۱ گرم داکسی زند ۵۰ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن یکبار در روز بمدت ۳ تا ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each gram of Doxyzand 50 contains 500 mg Doxycycline (as hyclate).

Indications: Doxyzand 50 is indicated for treatment of Colibacillosis, CRD, Pasteurellosis, Necrotic enteritis, Infectious coryza, Salmonellosis and Staphylococcal infections.

Dosage and administration:

Broiler: 20 mg per kg BW equivalent to 200-400 grams Doxyzand 50 in 1000 liters of drinking water for 4-7 days.

Calf and sheep: 10 mg per kg BW equivalent to 1 g Doxyzand 50 per 50 kg BW for 3-5 days

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Broilers: 4 days.

Contra-indications: Do not use Doxyzand 50 while using aminoglycosides and products containing calcium, magnesium and iron.

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 kg multilayer aluminium foil bag.

شرکت داروسازی فارمازند

ENROZAND

Enrofloxacin 10%
(Oral Solution)



انروزند

محلول خوراکی انروفلوکساسین ۱۰٪

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور ۹ روز و در بوقلمون ۱۱ روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان انروزند با فلورفنیکل، تتراسایکلین ها و ماکرولیدها پرهیز شود.

هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی انروزند حاوی ۱۰۰ میلی گرم انروفلوکساسین است.

موارد مصرف: انروزند جهت درمان بیماری های ناشی از باکتری های گرم مثبت، باکتری های گرم منفی، مایکوپلاسما نظیر CRD، کلی باسیلوز، پاستورلوز، کوریزای عفونی و سالمونلوز در طیور به کار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور گوشتی، مادر و بوقلمون: ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معادل ۰/۵ تا ۱ لیتر انروزند در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Enrozand contains 100 mg Enrofloxacin.

Indications: Enrozand is effective against Gram negative bacteria, some Gram positive bacteria and Mycoplasma spp. It is indicated for treatment of CRD, Colibacillosis, Pasteurellosis, Infectious coryza and Salmonellosis in poultry.

Dosage and administration:

Broiler, breeder and turkey: 20 mg per kg BW, equivalent to 0.5 - 1 liter Enrozand in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

-As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Broilers: 9 days

Turkeys: 11 days

Contra-indications: Do not use Enrozand while using Florfenicol, Tetracyclines and Macrolides.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

ERYTHROZAND

Erythromycin 20%
(W.S.P)



اریتروزند

پودر محلول در آب اریترومايسين ۲۰٪

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۳ روز

تخم مرغ: ۶ روز

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان اریتروزند با تتراسایکلین‌ها، فلورفنیکل و لینکوزامایدها پرهیز شود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه‌های چند لایه آلومینیومی ۵۰۰ گرمی

ترکیب: هر گرم اریتروزند حاوی ۲۰۰ میلی گرم اریترومايسين به صورت ملح تیوسیانات می‌باشد.

موارد مصرف: اریتروزند جهت درمان عفونت‌های دستگاه فوقانی تنفس، کوریزای عفونی، سینوزیت، CRD کمپلکس و آنتریت باکتریایی در طیور به کار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف: ۲۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۱۰۰ گرم اریتروزند در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of ErythroZand contains 200 mg Erythromycin (as thiocyanate).

Indications: ErythroZand is indicated for treatment of upper respiratory tract infections, sinusitis, CRD Complex, Infectious coryza, and bacterial enteritis in poultry.

Dosage and administration:

Poultry: 27 mg per BW, equivalent to 100 grams ErythroZand in 100 liters of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Meat: 3 days

Egg: 6 days

Contra-indications: Do not use ErythroZand while using Tetracyclines, Florfenicol and Lincosamides.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 500 gram multilayer aluminium foil sachet.

FLORZAND

Florfenicol 10%
(Oral Solution)



فلورزند

محلول خوراکی فلورفنیکل ۱۰٪

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: از مصرف فلورزند با لینکومایسین و ماکرولیدها پرهیز شود.

هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی فلورزند حاوی ۱۰۰ میلی گرم فلورفنیکل است.

موارد مصرف: فلورزند در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و باکتری های گرم منفی مانند استرپتوکوکوس، استافیلوکوکوس، کلستریدیوم، اشریشیا کلی، پاستورلا، هموفیلوس، اکتینوباسیلوس و کورینه باکتریوم پایوژنز موثر می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا معادل:

- ۱ تا ۲ هفته: ۱ میلی لیتر فلورزند در ۱ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

- ۳ تا ۴ هفته: ۱/۳ میلی لیتر فلورزند در ۱ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

- بیش از ۵ هفته: ۱/۷ میلی لیتر فلورزند در ۱ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Florzand contains 100 mg Florfenicol.

Indications: Florzand is indicated for treatment of infections due to gram positive bacteria and gram negative bacteria such as Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., E.coli, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp. and Corinebacterium pyogenes.

Dosage and administration:

Poultry: 30 mg per kg BW, equivalent to:

1 to 2 weeks of age: 1 ml in 1 liter of drinking water for 3 to 5 days.

3 to 4 weeks of age: 1.3 ml in 1 liter of drinking water for 3 to 5 days.

Above 5 weeks of age: 1.7 ml in 1 liter of drinking water for 3 to 5 days.

-As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Broiler: 5 days

Contra-indications: Do not use Florzand while using lincomycin and macrolides.

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

FOSFOZAND

Fosfomycin Calcium 25%
(W.S.P)



فسفوزند

پودر محلول در آب فسفومايسين كلسيم ۲۵٪

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۷ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت های چند لایه آلومینیومی ۱ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم فسفوزند حاوی ۲۵۰ میلی گرم فسفومايسين كلسيم است.

موارد مصرف: فسفوزند جهت درمان کلی باسیلوز، پاستورلوز، سالمونلوز، کوریزای عفونی و عفونت های استافیلوکوکی در طیور به کار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

۱۶۰ میلی گرم فسفوزند به ازای هر کیلوگرم وزن زنده پرنده (معادل ۱۶۰ گرم فسفوزند به ازای ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده پرنده) در آب آشامیدنی مصرفی ۶ تا ۸ ساعت اولیه روز، به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی.

نحوه محاسبه میزان مصرف:

میزان مصرف فسفوزند (گرم) = تعداد پرنده x میانگین وزن زنده پرنده در آخرین روز درمان (کیلوگرم) x ۰/۱۶

Composition: Each gram of Fosfozand contains 250 mg Fosfomycin Calcium.

Indications: Fosfozand is indicated for Colibacillosis, Pasteurelosis, Salmonellosis, Infectious Coryza and Staphylococcal infections in poultry.

Dosage and administration: 160 mg per kg Fosfozand equivalent to 160 g Fosfozand per 1000 kg BW, in the first 6 to 8 hours of day.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: 7 days

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 kg multilayer aluminium foil bag.

LINCOFEEDOZAND

Lincomycin 0.88%
(Premix)



لینکوفیدوزند

پودر مخلوط در دان لینکومايسين ۰/۸۸٪

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

تداخل دارویی: تجویز همزمان لینکوفیدوزند با ماکرولیدها مانند تایلوژین و اریترومايسين موجب تداخل دارویی می‌گردد. **هشدار:** در طیور مادر و طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می‌رسد، منع شده است.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های چند لایه آلومینیومی ۵ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم پرمیکس لینکوفیدوزند حاوی ۸/۸ میلی گرم لینکومايسين بصورت ملح هیدروکلراید می‌باشد.

موارد مصرف: لینکوفیدوزند جهت کنترل بیماری آنتریت نکروتیک (ورم روده نکروتیک) ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس، کمک به رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی در طیور گوشتی و کنترل CRD مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و نحوه مصرف: ۵۰۰ گرم لینکوفیدوزند در هر تن دان از هفته اول پرورش طیور گوشتی تا انتهای دوره - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of Lincofeedozand contains 8.8 mg Lincomycin (as Hydrochloride).

Indications: Lincofeedozand is used in order to control of Necrotic Enteritis caused by *C. perfringens* and it improve growth, reduced FCR in Broilers and also it helps controlling CRD.

Dosage and administration: Mix 500 g of Lincofeedozand in one tonne of complete feed from the first week of growing period till the end -As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Broilers: 5 day.

Contra-indications: Do not use Lincofeedozand in a same feed with any Macrolids such as Tylosin and Erythromycin.

Warning: Use of this product in the feed of commercial layers and those breeders which their eggs may be used by humane as food should be avoided.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 kg multilayer aluminium foil bag.

METHOXIZAND

Sulfadimethoxin 20%
+
Trimethoprim 4%
(Oral Solution)



متوکسی زند

محلول خوراکی سولفادی متوکسین ۲۰٪ + تری متوپریم ۴٪

زمان پرهیز از مصرف: مصرف متوکسی زند ۵ روز قبل از کشتار طیور قطع شود.

موارد منع مصرف: ندارد.

هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: متوکسی زند در طیور با سن بالای ۱۶ هفته مصرف نشود. از مصرف متوکسی زند در آب های اسیدی پرهیز شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۵۰۰ میلی لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر متوکسی زند حاوی:

سولفادی متوکسین	۲۰۰ میلی گرم
تری متوپریم	۴۰ میلی گرم

موارد مصرف: متوکسی زند جهت درمان عفونت های استرپتوکوکی و استافیلوکوکی، کلی باسیلوز، کوریزای عفونی، وبای ماکیان و سالمونلوزیس مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۵۰۰ میلی لیتر متوکسی زند در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

Composition: Each milliliter of Methoxizand contains:

Sulfadimethoxine	200 mg
Trimethoprim	40 mg

Indications: Methoxizand is indicated for treatment of Streptococcal and Staphylococcal infections, Colibacillosis, Infectious coryza, Pasteurelosis and Salmonellosis in poultry.

Dosage and administration:

500 ml Methoxizand in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: 5 days

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Don't use in the flock above 16th weeks age and not to be used in drinking acidic water. Keep out of reach of children.

Presentation: 500 ml polyethylene bottle.

NEOZAND

Neomycin Sulfate 20%
(Oral Solution)



نئوزند

محلول خوراکی نئوماکسین سولفات ۲۰٪

- از ۹ تا ۲۶ هفتگی: ۱ لیتر نئوزند در ۱۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گوساله، بره و بزغاله: ۱ میلی لیتر از محلول نئوزند به ازای ۱۰ کیلوگرم وزن بدن در آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک
شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.
زمان پرهیز از مصرف:
جوجه های گوشتی: ۷ روز
گوساله، بره و بزغاله: ۳۰ روز
بوقلمون: ۱۴ روز
موارد منع مصرف: از مصرف نئوزند در موارد نارسایی کبدی و کلیوی و انسداد روده پرهیز شود.
موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر محلول نئوزند حاوی ۲۰۰ میلی گرم نئوماکسین سولفات می باشد.
موارد مصرف: نئوزند جهت درمان آنتریت باکتریایی ناشی از اشریشیا کلی در گوساله، بره و بزغاله، آنتریت باکتریایی طیور و بیماری تاج آبی در بوقلمون مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار و نحوه مصرف:
جوجه گوشتی:
- از یک روزگی تا ۲ هفتگی: ۱ لیتر نئوزند در ۴۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- از ۳ تا ۵ هفتگی: ۱ لیتر نئوزند در ۳۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- از ۶ هفتگی تا پایان دوره: ۱ لیتر نئوزند در ۲۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
بوقلمون:
- از ۱ تا ۷ روزگی: ۱ لیتر نئوزند در ۲۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- از ۲ تا ۸ هفتگی: ۱ لیتر نئوزند در ۱۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

Composition: Each milliliter of Neozand contains 200 mg Neomycin (as sulfate).

Indications: Neozand is indicated for treatment of bacterial enteritis caused by E.coli in calf, lamb and kid, bacterial enteritis in poultry and Blue comb disease in turkey.

Dosage and administration:

Broiler:

1 to 2 weeks of age: 1 liter Neozand in 4000 liters of drinking water for 3 to 5 day

3 to 5 weeks of age: 1 liter Neozand in 3000 liters of drinking water for 3 to 5 day

From 6 weeks of age: 1 liter Neozand in 2000 liters of drinking water for 3 to 5 day

Turkey:

First week of age: 1 liter Neozand in 2500 liters of drinking water for 3 to 5 day

2 to 8 weeks of age: 1 liter Neozand in 1500 liters of drinking water for 3 to 5 days.

9 to 26 weeks of age: 1 liter Neozand in 1200 liters of drinking water for 3 to 5 days.

Calf, lamb and kid: 1 ml of Neozand per 10 kg body weight in drinking water for 3 to 5 days.

- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time:

Broiler: 7 days

Calf, lamb and kid: 30 days

Turkey: 14 days

Contra-indications: Do not use Neozand in hepatic or renal failure or intestinal obstruction.

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

OXYZAND 50

Oxytetracycline Hydrochloride 50%
(Premix)



اکسی زند ۵۰

پودر مخلوط در دان اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید ۵۰٪

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی ۷ روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اکسی زند ۵۰ با آنتی بیوتیک‌هایی مانند پنی سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها، کینولون‌ها و آمینو گلیکوزیدها توصیه نمی‌شود. جذب این دارو در صورت مصرف همزمان با داروهای محتوی کلسیم، منیزیم و آهن کاهش می‌یابد.

موارد احتیاط: در طیور تخمگذار در طی دوره تولید استفاده نشود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های چند لایه آلومینیومی یک کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم اکسی زند ۵۰ حاوی ۵۰۰ میلی گرم اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید است.

موارد مصرف: اکسی زند ۵۰ در موارد عفونت‌های گوارشی و تنفسی ناشی از باکتری‌های حساس به اکسی تتراسایکلین مانند اشريشیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا، استافیلوکوکوس و مایکوپلاسما بکار می‌رود. اکسی زند ۵۰ جهت درمان کلی باسیلوز، CRD، سالمونلوزیس، وبای ماکیان، کریزای عفونی، عفونت‌های استافیلوکوکی و سایر بیماری‌های باکتریایی کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف: ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم اکسی زند ۵۰ در هر تن دان بمدت ۵ تا ۷ روز - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of Oxyzand 50 contains 500 mg Oxytetracycline (as Hydrochloride).

Indications: Oxyzand 50 is effective against respiratory infections, caused by E.coli, Pasteurella multocida, Staphylococcus, Haemophilus, Mycoplasmas and against enteric infections, caused by Clostridium spp., Salmonella spp., Campylobacter spp., in poultry.

Dosage and administration:

For oral administration via feed

• Poultry: 200 to 500 g per 1 tonne of complete feed for 5 to 7 days.

Mixed with feed, the product should be used immediately.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time:

Poultry meat : 7 days

Contra-indications: Do not use Oxyzand in hepatic or renal failure or intestinal obstruction.

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 kg multilayer aluminium foil bag.

شرکت داروسازی فارمازند

SPECTINOZAND

Lincomycin + Spectinomycin
(W.S.P)



اسپکتینوزند

پودر محلول در آب لینکومایسین + اسپکتینومایسین

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور گوشتی ۲ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد. از مصرف تخم مرغ تا ۱۰ روز پس از قطع دارو پرهیز شود.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان اسپکتینوزند با ماکرولیدها و فلورفنیکول پرهیز شود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه‌های چند لایه آلومینیومی ۱۵۰ گرمی

ترکیب: هر گرم اسپکتینوزند حاوی ۲۲۲ میلی‌گرم لینکومایسین به صورت ملح هیدروکلراید و ۴۴۴ میلی‌گرم اسپکتینومایسین به صورت ملح سولفات می‌باشد.

موارد مصرف: اسپکتینوزند بر روی بسیاری از باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسمای طيور موثر می‌باشد. از اسپکتینوزند می‌توان جهت درمان CRD Complex، پاستورلوز، سالمونلوز و عفونت‌های استافیلوکوکی در طیور استفاده کرد.

مقدار و نحوه مصرف:

- جهت درمان CRD Complex: ۱۵۰ گرم اسپکتینوزند در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ تا ۷ روز
- جهت درمان سینوویت عفونی طیور: ۱۵۰ گرم اسپکتینوزند در ۴۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ تا ۷ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each gram of Spectinozand contains 222 mg Lincomycin (as Hydrochloride) and 444mg Spectinomycin (as Sulphate).

Indications: Spectinozand is effective against gram positive and gram negative bacteria and Mycoplasma spp. Spectinozand is indicated for treatment of CRD Complex, Pasteurellosis, Salmonellosis and Staphylococcal infections in poultry.

Dosage and administration:

Treatment of CRD Complex: 150 grams Spectinozand in 200 liters of drinking water for 5-7 days.

Treatment of Infectious synovitis: 150 grams Spectinozand in 400 liters of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Broilers: 2 days

Layers (egg): 10 days

Contra-indications: Do not use Spectinozand while using Macrolides or Florfenicol.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 150 gram multilayer aluminium foil sachet.

TIAMOZAND

Tiamulin 45%
(W.S.P)



تیاموزند

پودر محلول در آب تیامولین ۴۵٪

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: در جوجه گوشتی ۳۶ ساعت و بوقلمون ۴ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان تیاموزند با کوکسیدیوستات‌های یونوفوره مانند مونن‌سین، سالینومایسین و ناراسین خودداری شود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه‌های چند لایه آلومینیومی ۱۰۰ گرمی

ترکیب: هر گرم تیاموزند حاوی ۴۵۰ میلی گرم تیامولین به صورت ملح هیدروژن فومارات می‌باشد.

موارد مصرف: تیاموزند بر باکتری‌های گرم مثبت و باکتری‌های گرم منفی مانند استرپتوکوکوس، استافیلوکوکوس، کلوستریدیوم، هموفیلوس، پاستورلا، کامپیلوباکتر و مایکوپلاسما موثر می‌باشد. تیاموزند جهت درمان مایکوپلاسموز در طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و نحوه مصرف: ۱۰۰ گرم تیاموزند در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each gram of Tiamozand contains 450 mg Tiamulin (as Hydrogen Fumarate).

Indications: Tiamozand is effective against gram positive and gram negative bacteria such as Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Campylobacter spp. and Mycoplasma spp. Tiamozand is indicated for treatment of Mycoplasmosis in poultry.

Dosage and administration:

100 grams of Tiamozand in 200 liters of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Broiler: 36 hours

Turkey: 4 days

Contra-indications: Do not use Tiamozand while using Monensin, Salinomycin and Naracin.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 100 gram multilayer aluminium foil sachet.

TILMOZAND

Tilmicosin 25%
(Oral Solution)



تیلموزند

محلول خوراکی تیل مایکوزین ۲۵٪

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۱۲ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود. **هشدار:** در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های PET ۶۰ و ۲۴۰ میلی لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی تیلموزند حاوی ۲۵۰ میلی گرم تیل مایکوزین به صورت ملح فسفات است.

موارد مصرف: تیلموزند جهت درمان عفونت های تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسما، پاستورلا، اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال و سایر باکتری های حساس مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف: هر بطری ۶۰ میلی لیتری در ۲۰۰ لیتر یا هر بطری ۲۴۰ میلی لیتری در ۸۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز. درمان مجدد در موارد لزوم می تواند به مدت ۱ تا ۲ روز تکرار شود. - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Tilmozand contains 250 mg Tilmicosin (as phosphate).

Indications: Tilmozand is indicated for treatment of respiratory infections due to Mycoplasma spp., Pasteurella spp., Ornithobacterium rhinotracheale and other sensitive bacteria in poultry.

Dosage and administration:

Each 60 ml Tilmozand in 200 liters or each 240 ml Tilmozand in 800 liters of drinking water for 3 days. Repeat later for 1-2 days if required.

-As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: 12 days

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 60 and 240 ml PET bottle.

TYLOZAND

Tylosin Tartrate
(W.S.P)



تایلوزند

پودر محلول در آب تایلوژین

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: در جوجه‌های گوشتی ۲۴ ساعت و در بوقلمون ۵ روز قبل از کشتار مصرف تایلوزند قطع شود.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان تایلوزند با کوکسیدیواستات‌های یونوفوره مانند سالینومایسین و موننسین پرهیز شود.

هشدار: در طیور تخم‌گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می‌رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه‌های چند لایه آلومینیومی ۱۰۰ گرمی

ترکیب: هر ساشه تایلوزند حاوی ۱۰۰ گرم تایلوژین به صورت ملح تارترات می‌باشد.

موارد مصرف: تایلوزند جهت درمان CRD در جوجه‌های گوشتی و سینوزیت عفونی بوقلمون‌ها ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، اسپیروکتوز در ماکیان و بوقلمون‌ها، آنتریت نکروتیک و کریزای عفونی در طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی و بوقلمون: محتوای هر ساشه ۱۰۰ گرمی تایلوزند را در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل کرده و به مدت ۲ تا ۵ روز مصرف شود.

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each sachet contains 100 grams Tylosin (as tartrate).

Indications: Tylozand is indicated for treatment of chronic respiratory disease in broilers and infectious sinusitis in turkeys caused by Mycoplasma gallisepticum, spirochetosis in fowls and turkeys, necrotic enteritis and infectious coryza in poultry.

Dosage and administration:

Broiler and turkey: Each sachet in 200 liters of drinking water for 2-5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Broiler: 1 day

Turkey: 5 days

Contra-indications: Do not use Tylozand while using ionophores.

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 100 gram multilayer aluminium foil sachet.



TYLOZAND 10

Tylosin Phosphate 10%
(Granulated Premix)

تایلوزند ۱۰

گرانول مخلوط در دان تایلوژین فسفات ۱۰٪

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: در جوجه های گوشتی ۲۴ ساعت و در بوقلمون ۵ روز قبل از کشتار مصرف تایلوزند ۱۰ قطع گردد.

موارد منع مصرف: در طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد استفاده نشود.

تداخلات دارویی: از تجویز همزمان با لینکوزامیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

موارد احتیاط: بصورت یکنواخت در دان میکس گردد. در هنگام حمل و کار با دارو از لباس محافظ و ماسک ضد غبار استفاده شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت های چند لایه آلومینیومی ۱ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم تایلوزند ۱۰ حاوی ۱۰۰ میلی گرم تایلوژین بصورت ملح فسفات می باشد.

موارد مصرف: تایلوزند ۱۰ در درمان بیماری های مزمن تنفسی CRD کمپلکس و آنتریت نکروتیک در طیور گوشتی، تخم گذار و بوقلمون مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

جهت درمان بیماری های تنفسی: مقدار ۱۱ کیلوگرم تایلوزند ۱۰ در هر تن دان (معادل ۱۲۷ میلی گرم تایلوزند ۱۰ به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) روزانه در ۵ روز اول زندگی و سپس تکرار به مدت ۲ روز در هفته سوم و چهارم جهت درمان آنتریت نکروتیک: مقدار ۸۷۵-۱۷۵۰ گرم تایلوزند ۱۰ در هر تن دان (معادل ۱۰-۲۰ میلی گرم تایلوزند ۱۰ به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) روزانه به مدت ۷ روز ابتدا مقدار مورد نیاز را با ۵۰ کیلوگرم مکمل و یا خوراک مخلوط کرده و سپس مخلوط حاصل را پس از افزودن به دان نهایی مجدداً مخلوط نمایید.

Composition: Each gram of Tylozand 10 contains 100 mg of Tylosin (as Phosphate).

Indications: Tylozand 10 is very effective in the treatment of Chronic Respiratory Disease complex (CRD-complex). It is also efficient in the treatment of infectious synovitis and sinusitis, as well as several other poultry diseases.

Dosage and administration: Mixed with complete feed Poultry:

- In respiratory disorders; 11kg Tylozand 10 per 1 tonne of complete feed Eq. to 127 mg/kg BW Tylosin phosphate at 5 initial days followed by 2 days at 3rd and 4th week.
- In Necrotic Enteritis cases: 875 to 1750 g Tylozand 10 per 1 tonne of complete feed Eq. to 10 to 20 mg/Kg BW Tylosin phosphate for 7 days.

Mixed with feed, the product should be used immediately.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Broiler: 1 day

Turkey: 5 days

Interactions: Do not use with Lincosamides and Aminoglycosids at the same time.

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 Kg multilayer aluminium bags.

TYLOZAND 25

Tylosin Phosphate 25%
(Granulated Premix)



تایلوزند ۲۵

گرانول مخلوط در دان تایلوژین فسفات ۲۵٪

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: در جوجه های گوشتی ۲۴ ساعت و در بوقلمون ۵ روز قبل از کشتار مصرف تایلوزند ۲۵ قطع گردد.

موارد منع مصرف: در طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد استفاده نشود.

تداخلات دارویی: از تجویز همزمان با لینکوزامیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: بصورت یکنواخت در دان میکس گردد. در هنگام حمل و کار با دارو از لباس محافظ و ماسک ضد غبار استفاده شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت های چند لایه آلومینیومی ۱ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم تایلوزند ۲۵ حاوی ۲۵۰ میلی گرم تایلوژین بصورت ملح فسفات می باشد.

موارد مصرف: تایلوزند ۲۵ در درمان بیماری های مزمن تنفسی CRD کمپلکس و آنتریت نکروتیک در طیور گوشتی، تخم گذار و بوقلمون مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

جهت درمان بیماری های تنفسی: مقدار ۲/۲ تا ۴/۲ کیلوگرم تایلوزند ۲۵ در هر تن دان (معادل ۱۲۷ میلی گرم تایلوژین فسفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) روزانه در ۵ روز اول زندگی و سپس تکرار به مدت ۲ روز در هفته سوم و چهارم جهت درمان آنتریت نکروتیک: مقدار ۳۵۰ تا ۷۰۰ گرم تایلوزند ۲۵ در هر تن دان (معادل ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم تایلوژین فسفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) روزانه به مدت ۷ روز ابتدا مقدار مورد نیاز را با ۵۰ کیلوگرم مکمل و یا خوراک مخلوط کرده و سپس مخلوط حاصل را پس از افزودن به دان نهایی مجدداً مخلوط نمایید.
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each gram of Tylozand 25 contains 250 mg of Tylosin (as Phosphate).

Indications: Tylozand 25 is very effective in the treatment of Chronic Respiratory Disease complex (CRD-complex). It is also efficient in the treatment of infectious synovitis and sinusitis, as well as several other poultry diseases.

Dosage and administration: Mixed with complete feed Poultry:

- In respiratory disorders; 2.2 to 4.2 kg Tylozand 25 per 1 tonne of complete feed Eq. to 127 mg/kg BW Tylosin phosphate at 5 initial days followed by 2 days at 3rd and 4th week.
- In Necrotic Enteritis cases: 350 to 700 g Tylozand 25 per 1 tonne of complete feed Eq. to 10 to 20 mg/Kg BW Tylosin phosphate for 7 days.

Mixed with feed, the product should be used immediately.
- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time:

Broiler: 1 day

Turkey: 5 days

Interactions: Do not use with Lincosamides and Aminoglycosids at the same time.


Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 Kg multilayer aluminium bags.

شرکت داروسازی فارمازند

VITAMINS

-  ALFAZAND
-  AMINOZAND
-  B.K ZAND
-  B VITAZAND
-  C ZAND
-  CARNOZAND
-  DECIKAZAND
-  DECIZAND
-  ELECTROZAND
-  LIPOZAND
-  MULTIZAND

ALFAZAND

Vitamin E + Selenium
(Oral Solution)



آلفازند

محلول خوراکی ویتامین ای + سلنیوم

ترکیب: هر میلی لیتر محلول آلفازند حاوی:

۱۰۰ میلی گرم	ویتامین E استات
۰/۵ میلی گرم	سلنیت سدیم

موارد مصرف: این محصول به جهت پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین E و سلنیوم مانند آنسفالومالاسی، کاهش رشد، کاهش تولید تخم مرغ و کاهش باروری و جوجه درآوری در گله‌های مادر مصرف می‌گردد.

همچنین از این محصول به جهت پیشگیری و درمان موارد کاهش رشد و بیماری ماهیچه سفید در گوساله و بره و نیز بیماری دیستروفی عضلانی، جفت ماندگی، کاهش باروری و کاهش مقاومت نسبت به عوامل عفونی در گاو، گوسفند و بز استفاده می‌گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی
گوسفند و بز: ۱ میلی لیتر در ۱ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی
گوساله: ۱ میلی لیتر در ۱ لیتر غذای مایع (شیر) به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی

گاو شیری: ۱ میلی لیتر در ۱ لیتر آب آشامیدنی، چهار بار در طول ماه قبل از زایش، با فاصله ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد منع مصرف: ندارد.

هشدار: از مصرف این ترکیب، بیش از ۱۰ روز متوالی اجتناب گردد. همراه با سایر ترکیبات حاوی سلنیوم مصرف نگردد.

موارد احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر ۱۲ ساعت پس از آماده سازی مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

Composition: Each milliliter of Alfazand contains:

Vitamin E Acetate	100 mg
Sodium Selenite	0.5 mg

Indications: Alfazand is indicated for:

- To treat and prevention of Vitamin E and Selenium deficiencies such as Encephalomalacia, retarded growth, decreasing egg production, fertility and hatchability in breeders
- To treat retarded growth and white muscle disease in calf and lambs and other vitamin E deficiencies syndrome in goats and sheep
- To improve immune system response in vaccination and after infectious diseases

Dosage and administration:

- Poultry: 1 liter of Alfazand in 1000 liters of drinking water for 3 to 5 continuous days
- Sheep and Gout: 1 milliliter of Alfazand in 1 liter of drinking water for 3 to 5 continuous days

- Calf: 1 milliliter of Alfazand in 1 liter of liquid feed (Milk) for 3 to 5 continuous days
- Cattle: 1 milliliter of Alfazand in 1 liter of drinking water for 4 times in each month before calving
- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Warning: Do not use this product for more than 10 continuous days and not use with other products contains selenium to avoid selenium toxicity

Precaution: Medicated water is better to use after 12 hour preparation. Keep out of reach of children

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

AMINOZAND

Multivitamin + Electrolytes
(Oral Solution)



آمینوزند

محلول خوراکی مولتی ویتامین + اسید آمینه

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی آمینوزند حاوی:

ویتامین A پالمیتات	۱۰/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول)	۲/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین E استات	۴ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید)	۱/۵ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین-۵-فسفات سدیم)	۴ میلی گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۲ میلی گرم
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین)	۶ میکروگرم
نیاسین آمید	۱۰ میلی گرم
دکسپانتنول	۵ میلی گرم
ال - متیونین	۲۱ میلی گرم
ال - لیزین هیدروکلراید	۳۰ میلی گرم
ال - آرژنین مونو هیدروکلراید	۵ میلی گرم

موارد مصرف: آمینوزند جهت بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش سرعت رشد و هنگام مواجه شدن با استرس ناشی از واکسیناسیون، بیماری‌ها، حمل و نقل و گرما در طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و نحوه مصرف: ۱ لیتر آمینوزند در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

Composition: Each milliliter of AminoZand contains:

Vitamin A Palmitate	10,000 I.U.
Vitamin D3 (Cholecalciferol)	2,000 I.U.
Vitamin E Acetate	4 mg
Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride)	1.5 mg
Vitamin B2 (Riboflavin-5-Sodium Phosphate)	4 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	2 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	6 µg
Niacinamide	10 mg
Dexpanthenol	5 mg
L - Methionine	21 mg
L - Lysine hydrochloride	30 mg
L - Arginine monohydrochloride	5 mg

Indications: AminoZand is indicated for improving feed conversion ratio, increasing growth rate, for stressful conditions caused by vaccination, diseases, transportation and high temperature in poultry.

Dosage and administration:

1 liter AminoZand in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

B.K ZAND

B-Complex + Vitamin K
(W.S.P)



پودر محلول در آب ب. کمپلکس + ویتامین کا

بی کازند

ترکیب: هر گرم پودر بی کارند حاوی:

۲ میلی گرم	ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید)
۴ میلی گرم	ویتامین B2 (ریبوفلاوین-۵-فسفات سدیم)
۲ میلی گرم	ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)
۱۰ میلی گرم	کلسیم پنتوتنات
۲۰ میلی گرم	نیاسین آمید
۰/۲۵ میلی گرم	فولیک اسید
۰/۰۲ میلی گرم	ویتامین B12 (سیانوکوبالامین)
۰/۰۵ میلی گرم	د-بیوتین
۲ میلی گرم	ویتامین K3

موارد مصرف: استفاده از بی کازند در موارد زیر توصیه می گردد:
- هنگام بروز کمبودهای تغذیه ای ویتامین های گروه B و K
- کمک به تسریع در انعقاد خون در صورت نوک چینی
- درمان حمایتی مسمومیت با میکوتوکسین ها، سندروم کبد و کلیه خونریزی دهنده و بیماری های عفونی نظیر گامبور و IBH

- درمان کم خونی های ناشی از مصرف طولانی مدت سولفانامیدها
- مقدار و نحوه مصرف: ۱ تا ۳ کیلوگرم محصول در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک
شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد منع مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت یک ماه مصرف گردد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: پاکت های چند لایه آلومینیومی ۵۰۰ گرمی

Composition: Each gram of B.K zand contains:

Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride)	2 mg
Vitamin B2 (Riboflavin-5-Phosphate Sodium)	4 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	2 mg
Calcium pantothenate	10 mg
Niacinamide	20 mg
Vitamin B9	0.25 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	0.02 mg
Vitamin H (Biotin)	0.05 mg
Vitamin K3	2 mg

Indications: B.K zand is indicated for:

- To treat nutritional deficiencies to B vitamins and vitamin K
- In beak trimming to avoid bleeding and to help blood coagulation
- As supportive therapy in mycotoxins' toxicities, patty

Liver and hemorrhagic kidney syndrome and some infectious diseases such as IBD and IBH
- To treat anemia caused by long Sulfonamides therapy
- After antibiotic therapy to rebuilt flock condition

Dosage and administration:

1 to 3 Kg of B.K zand in 1000 liters of drinking water, for 3 to 5 continuous days.
- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Opened bag should be consumed in 1 month. Keep out of reach of children.

Presentation: 500 gram multilayer aluminium foil sachet.

شرکت داروسازی فارمازند

B VITAZAND

B. Complex
(Oral Solution)



بی‌ویتازند

محلول خوراکی ب.کمپلکس

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی بی ویتازند حاوی:

ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید)	۱۰ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین-۵-فسفات سدیم)	۱/۵ میلی گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۴ میلی گرم
دکسپانتنول	۵ میلی گرم
نیاسین آمید	۲۵ میلی گرم

موارد مصرف: درمان موارد کمبود ویتامین‌های گروه ب و علائم آن نظیر اختلالات عصبی و ناهنجاری‌های اسکلتی
- افزایش رشد در نژادهای گوشتی و بهبود ضریب تبدیل دان و افزایش تولید در مرغ‌های تخمگذار
- افزایش میزان باروری و قابلیت جوجه درآوری در مرغ‌های مادر
- مقابله با انواع استرس‌ها و افزایش مقاومت سیستم ایمنی در مقابله با بیماری‌های عفونی
- به عنوان درمان حمایتی در سندرم کبد چرب

مقدار و نحوه مصرف: ۱ لیتر محلول بی ویتازند در ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی بمدت ۵ تا ۷ روز متوالی - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد منع مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر ۱۲ ساعت پس از آماده سازی مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

Composition: Each milliliter of B Vitazand contains:

Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride)	10 mg
Vitamin B2 (Riboflavin-5-Phosphate Sodium)	1.5 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	4 mg
Dexpanthenol	5 mg
Niacinamide	25 mg

Indications: B Vitazand is indicated for:

- To treat vitamin B deficiencies symptoms such as skeletal problems and nervous distress
- To increase growth rate in Broilers and decreasing FCR and egg production in Layers
- To increase fertility and hatchability in Breeders
- To decrease adverse effects of any stress condition and help immune system against infectious diseases
- As supportive therapy in fatty liver syndrome

Dosage and administration:

1 liter of B Vitazand in 1000 to 2000 liters of drinking water, for 5 to 7 continuous days.

- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Medicated water is better to use after 12 hour preparation. Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

CZAND

Vitamin C 50%
(W.S.P)



سی زند

پودر محلول در آب ویتامین سی ۵۰٪

بیماری‌های عفونی و انگلی: ۳۰ گرم سی زند در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی یا ۶۰ گرم سی زند در ۱۰۰ کیلوگرم دان به مدت ۳ تا ۵ روز

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: آب حاوی دارو حداکثر ۱۲ ساعت پس از تهیه مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های چند لایه آلومینیومی ۱ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم سی زند حاوی ۵۰۰ میلی گرم ال-آسکوربیک اسید می‌باشد.

موارد مصرف: در موارد استرس ناشی از گرما و سرمای شدید، استرس حمل و نقل، استرس ناشی از محرومیت غذایی و تغییرات ناگهانی جیره، استرس واکسیناسیون، استرس ناشی از بیماری‌های ویروسی و انگلی، جهت بهبود پاسخ ایمنی در حین واکسیناسیون در طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

در موارد استرس ناشی از گرما و استرس تولید در طیور تخم گذار: ۶ تا ۱۲ گرم سی زند در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی یا ۱۲ تا ۲۴ گرم سی زند در ۱۰۰ کیلوگرم دان به مدت ۳ تا ۵ روز
استرس ناشی از واکسیناسیون و نوک چینی: ۱۲ تا ۲۰ گرم سی زند در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی یا ۲۴ تا ۴۰ گرم سی زند در ۱۰۰ کیلوگرم دان به مدت ۳ تا ۵ روز

Composition: Each gram of Czand contains 500 mg ascorbic acid.

Indications: Czand is indicated for improving growth, production, fertility and hatchability rate, egg shell quality and bone formation, immune responses and for intoxications and stressful conditions (vaccination, transport, high temperature).

Dosage and administration:

Heat stress condition: 6 to 12 g Czand in 100 liters of drinking water (12 to 24 g Czand in 100 kg feed) for 3-5 days.
Vaccination: 12 to 20 g Czand in 100 liters of drinking water (24 to 40 g Czand in 100 kg feed) for 3-5 days.

Infectious disease as well as parasite infestation: 30 g Czand in 100 liters of drinking water (60 g Czand in 100 kg feed) for 3-5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 kg multilayer aluminium foil bag.

شرکت داروسازی فارمازند

CARNOZAND

B. Complex + L-Carnitine
(Oral Solution)



محلول خوراکی ب کمپلکس + ال - کارنیتین

کارنوزند

محلول خوراکی ب کمپلکس + ال - کارنیتین

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی کارنوزند حاوی:

۳۰ میلی گرم	ال-کارنیتین
۴ میلی گرم	ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید)
۵ میلی گرم	ویتامین B2 (ریبوفلاوین-۵-فسفات سدیم)
۲ میلی گرم	ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)
۲۰ میکروگرم	ویتامین B12 (سیانوکوبالامین)
۱۰ میلی گرم	نیاسین آمید
۴ میلی گرم	دکسپانتنول
۱۰ میکروگرم	دی-بیوتین

مقدار و نحوه مصرف:
طیور گوشتی، مادر و تخم گذار: ۵۰۰ میلی لیتر کارنوزند در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۷ روز - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: آب حاوی دارو حداکثر ۱۲ ساعت پس از تهیه مصرف شود. حداکثر تا ۲ ماه پس از باز شدن درب بطری مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

موارد مصرف: بهبود میزان باروری و قابلیت جوجه درآوری، بهبود ضریب تبدیل غذایی و یکنواختی گله، بهبود میزان رشد و تولید، در هنگام بروز استرس ها و بیماری ها

Composition: Each milliliter of Carnozand contains:

L - Carnitine	30 mg
Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride)	4 mg
Vitamin B2 (Riboflavin-5-Phosphate Sodium)	5 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	2 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	20 µg
Niacinamide	10 mg
Dexpanthenol	4 mg
D-Biotin	10 µg

Indications: Carnozand is indicated for improving fertility and hatchability rate, Improving feed conversion ratio and flock uniformity, Improving growth rate and production, For stressful conditions and diseases.

Dosage and administration:

Broiler, Breeder and Layer: 500 ml Carnozand in 1000 liters of drinking water for 3-7 days.

-As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Remove the medicated water after 12 hours. Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

DECIKAZAND

Vitamin A, D₃, E, C, K
(Oral Solution)



دسی کازند

محلول خوراکی AD₃ECK

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی دسی کازند حاوی:

ویتامین A پالمیتات	۲۵/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین D ₃ (کوله کلسیفرول)	۵/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین E استات	۱۰ میلی گرم
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۱۰۰ میلی گرم
ویتامین K (منادیون سدیم بی سولفیت)	۷۵۰ میکروگرم

موارد مصرف: دسی کازند جهت پیشگیری و درمان کمبود ویتامین های A، D₃، E، C و K در موارد استرس ناشی از واکسیناسیون، حمل و نقل، گرما و تراکم، در هنگام مواجهه با بیماری های عفونی، جهت بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و افزایش میزان باروری و جوجه درآوری و همچنین جهت پیشگیری و درمان خونریزی های زیر جلدی و خونریزی های ناشی از کوکسیدیوز مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گاو و گوساله: ۲ میلی لیتر دسی کازند در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گوسفند و بز: ۱ میلی لیتر دسی کازند در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

Composition: Each milliliter of Decikazand contains:

Vitamin A Palmitate	25,000 I.U.
Vitamin D ₃ (Cholecalciferol)	5,000 I.U.
Vitamin E Acetate	10 mg
Vitamin C (Ascorbic Acid)	100 mg
Vitamin K (Menadione Sodium Bisulfite)	750 µg

Indications: Decikazand is indicated for prevention and treatment of vitamin A, D₃, E, C and K deficiencies, for stressful conditions (vaccination, transportation, heat stress), infectious diseases, improving egg shell quality, fertility and hatchability rate and for prevention and treatment of subcutaneous hemorrhages and hemorrhages caused by coccidiosis.

Dosage and administration:

Poultry: 1 liter Decikazand in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

Cattle and calf: 2 ml Decikazand per liter of drinking water for 3-5 days.

Sheep and goat: 1 ml Decikazand per liter of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

DECIZAND

Vitamin A, D₃, E, C
(Oral Solution)



دسی زند

محلول خوراکی AD₃EC

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی دسی زند حاوی:

ویتامین A پالمیتات	۵۰/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین D ₃ (کوله کلسیفرول)	۱۰/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین E استات	۱۰ میلی گرم
ویتامین C (آسکوربیک اسید)	۱۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: دسی زند جهت پیشگیری و درمان کمبود ویتامین های A، D₃، E و C در موارد استرس ناشی از واکسیناسیون، حمل و نقل، گرما و تراکم، در هنگام مواجهه با بیماری های عفونی و همچنین جهت بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و افزایش میزان باروری و جوجه درآوری مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر دسی زند در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گاو و گوساله: ۲ میلی لیتر دسی زند در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گوسفند و بز: ۱ میلی لیتر دسی زند در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

Composition: Each milliliter of Decizand contains:

Vitamin A Palmitate	50,000 I.U.
Vitamin D ₃ (Cholecalciferol)	10,000 I.U.
Vitamin E Acetate	10 mg
Vitamin C (Ascorbic Acid)	100 mg

Indications: Decizand is indicated for prevention and treatment of vitamin A, D₃, E and C deficiencies, for stressful conditions (vaccination, transportation, heat stress), infectious diseases and improving egg shell quality, fertility and hatchability rate.

Dosage and administration:

Poultry: 1 liter Decizand in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

Cattle and calf: 2 ml Decizand per liter of drinking water for 3-5 days.

Sheep and goat: 1 ml Decizand per liter of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

ELECTROZAND

Multivitamin + Electrolytes
(Oral Solution)



الکتروزند محلول خوراکی مولتی ویتامین + الکتrolیت

نقاقت بیماری‌ها و موارد دهیدراتاسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر الکتروزند در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گاو و گوساله: ۲ میلی لیتر الکتروزند در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گوسفند و بز: ۱ میلی لیتر الکتروزند در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- سایر حیوانات طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی الکتروزند حاوی:

۱۰/۰۰۰ واحد بین‌المللی	ویتامین A پالمیتات
۳/۰۰۰ واحد بین‌المللی	ویتامین D3 (کوله کلسیفرول)
۵ میلی گرم	ویتامین E استات
۲ میلی گرم	ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید)
۲ میلی گرم	ویتامین B2 (ریبوفلاوین-۵-فسفات سدیم)
۱ میلی گرم	ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)
۱۰ میلی گرم	نیاسین آمید
۵ میلی گرم	دکسپانتنول
۱۰ میلی گرم	سدیم کلراید
۱ میلی گرم	پتاسیم کلراید
۳ میلی گرم	منیزیم کلراید شش آبه

موارد مصرف: الکتروزند جهت کنترل و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین‌های A، D3، E و گروه B مصرف می‌گردد. همچنین این دارو در مواقع ضعف حیوان، کاهش مقاومت عمومی، بی اشتها، اسهال‌های عفونی و تغذیه‌ای و در دوران

Composition: Each milliliter of ElectroZand contains:

Vitamin A Palmitate	10,000 I.U.
Vitamin D3 (Cholecalciferol)	3,000 I.U.
Vitamin E Acetate	5 mg
Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride)	2 mg
Vitamin B2 (Riboflavin-5-Phosphate Sodium)	2 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	1 mg
Niacinamide	10 mg
Dexpanthenol	5 mg
Sodium chloride	10 mg
Potassium chloride	1 mg
Magnesium chloride hexahydrate	3 mg

Indications: ElectroZand is indicated for prevention of vitamin A, D3, E and B complex deficiencies, in cases of weakness, loss of appetite, infectious and nutritional diarrhea and during convalescence.

Dosage and administration:

Poultry: 1 liter ElectroZand in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

Cattle and calf: 2 ml ElectroZand per liter of drinking water for 3-5 days.

Sheep and goat: 1 ml ElectroZand per liter of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

LIPOZAND

Vitamin A, D₃, E
(Oral Solution)



لیپوزند

محلول خوراکی AD₃E

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی لیپوزند حاوی:

ویتامین A پالمیتات	۱۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین D ₃ (کوله کلسیفرول)	۲۰/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین E استات	۴۰ میلی گرم

موارد مصرف: لیپوزند جهت پیشگیری و درمان کمبود ویتامین های A، D₃ و E، جهت بهبود میزان رشد، تولید و باروری، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر لیپوزند در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

گاو و گوساله: ۲ میلی لیتر لیپوزند در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گوسفند و بز: ۱ میلی لیتر لیپوزند در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

Composition: Each milliliter of Lipozand contains:

Vitamin A Palmitate	100,000 I.U.
Vitamin D ₃ (Cholecalciferol)	20,000 I.U.
Vitamin E Acetate	40 mg

Indications: Lipozand is indicated for prevention and treatment of vitamin A, D₃ and E deficiencies, Improving growth, production and fertility rate, improving immunity functions and for increasing egg shell quality.

Dosage and administration:

Poultry: 1 liter Lipozand in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

Cattle and calf: 2 ml Lipozand per liter of drinking water

Sheep and goat: 1 ml Lipozand per liter of drinking water for 3-5 days.

- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

MULTIZAND

Multivitamin
(Oral Solution)



مولتی زند

محلول خوراکی مولتی ویتامین

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی مولتی زند حاوی:

ویتامین A پالمیتات	۲۵/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول)	۱۵/۰۰۰ واحد بین المللی
ویتامین E استات	۵ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید)	۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین-۵-فسفات سدیم)	۲ میلی گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱/۶ میلی گرم
نیاسین آمید	۱۶ میلی گرم
دکسپانتنول	۴ میلی گرم

موارد مصرف: مولتی زند جهت پیشگیری از کمبود ویتامین های A، D3، E و گروه B در موارد استرس های گرمایی، واکسیناسیون و حمل و نقل، در موارد ابتلاء به بیماری های عفونی و همچنین جهت بهبود میزان تولید و باروری در طیور، گاو و گوسفند مورد استفاده قرار می گیرد

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گاو و گوساله: ۲ میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
گوسفند و بز: ۱ میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

Composition: Each milliliter of Multizand contains:

Vitamin A Palmitate	25,000 I.U.
Vitamin D3 (Cholecalciferol)	15,000 I.U.
Vitamin E Acetate	5 mg
Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride)	2 mg
Vitamin B2 (Riboflavin-5-Sodium Phosphate)	2 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)	1.6 mg
Niacinamide	16 mg
Dexpanthenol	4 mg

Indications: Multizand is indicated for prevention of vitamin A, D3, E and B complex deficiencies, for stressful conditions caused by vaccination, transportation and heat stress, infectious diseases and improving production and fertility rate in poultry, cattle and sheep.

Dosage and administration:

Poultry: 1 liter Multizand in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.

Cattle and calf: 2 ml Multizand per liter of drinking water for 3-5 days.

Sheep and goat: 1 ml Multizand per liter of drinking water for 3-5 days.

-As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

ANTICOCCIDIOSIS

-  AMPROZAND
-  AMPROZAND PLUS
-  AMPROZAND-S
-  DICLAZAND
-  MADUCARBAZAND
-  MADURAZAND
-  MONENSOZAND
-  SALINOZAND
-  TOLTRAZAND

AMPROZAND

Amprolium Hydrochloride 20% (W.S.P)



آمپروزاند

پودر محلول در آب آمپرولیوم هیدروکلراید ۲۰٪

زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.
موارد منع مصرف: این دارو نباید همراه ویتامین B1 و کولین کلراید (جیره های حاوی مقادیر بالای کولین) مصرف گردد.
هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد ، مصرف نشود.

موارد احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی ۱۲ ساعت پس از تهیه مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه های چند لایه آلومینیومی ۱۰۰ گرمی

ترکیب: هر گرم آمپروزاند حاوی ۲۰۰ میلی گرم آمپرولیوم هیدروکلراید می باشد.

موارد مصرف: از آمپروزاند جهت درمان کوکسیدیوز در مرغ گوشتی، پोलت تخم گذار ، مرغ مادر و بوقلمون، گوساله و بره استفاده می شود .

مقدار و نحوه مصرف:

مرغ گوشتی، پولت تخم گذار، مرغ مادر و بوقلمون: ۱۲۵ تا ۲۵۰ گرم آمپروزاند در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ تا ۷ روز
گوساله و بره: ۲ گرم آمپروزاند به ازای ۴۰ کیلوگرم وزن زنده از طریق آب آشامیدنی به مدت ۱ تا ۲ هفته
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of Amprozand contains 200 mg Amprolium Hydrochloride.

Indications: Amprozand is indicated for prevention and treatment of coccidiosis in broiler, layer pullet, breeder, turkey, calf and lamb.

Dosage and administration:

Broiler, layer pullet, breeder and turkey: 125 to 250 grams Amprozand in 200 liters of drinking water for 5 to 7 days.
Calf and lamb: 2 grams Amprozand per 40 kg body weight in drinking water for 1 to 2 weeks orally.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: 3 days

Contra-indications: Do not use Amprozand while using Thiamine (Vitamin B1) and choline chloride with high content in feed.


Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 100 gram multilayer aluminium foil sachet.

AMPROZAND PLUS

Amprolium 25%+Ethopabate 1.6%
(Premix)



آمپروزند پلاس

پودر مخلوط در دان آمپرولیوم ۲۵٪ + اتوپابات ۱/۶٪

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود. **زمان پرهیز از مصرف:** ۳ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

موارد منع مصرف: همراه با ویتامین B1 و کولین کلراید (جیره های حاوی مقادیر بالای کولین) مصرف نشود. همراه با سایر داروهای ضد کوکسیدیوز مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت های چند لایه آلومینیومی ۵ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم پودر آمپروزند پلاس حاوی ۲۵۰ میلی گرم آمپرولیوم هیدروکلراید و ۱۶ میلی گرم اتوپابات می باشد.

موارد مصرف: آمپروزند پلاس جهت کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در طیور مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی و بوقلمون: ۵۰۰ گرم در هر تن دان
پولت های تخم گذار و مادر:

- تا سن ۶ هفتگی: ۴۰۰ گرم در هر تن دان

- از سن ۶ تا ۱۲ هفتگی: ۳۲۵ گرم در هر تن دان

- از سن ۱۲ تا ۱۸ هفتگی: ۲۵۰ گرم در هر تن دان

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each gram of Amprozand Plus contains 250 mg amprolium hydrochloride and 16 mg ethopabate.

Indications: Amprozand Plus is indicated for prevention and control of coccidiosis in poultry.

Dosage and administration:

Broiler and turkey: 500 grams per tonne of feed

Breeder and layer pullet:

Up to 6 weeks of age: 400 grams per tonne of feed

6-12 weeks of age: 325 grams per tonne of feed.

12-18 weeks of age: 250 grams per tonne of feed.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: 3 days

Contra-indications: Do not use Amprozand Plus while using Thiamine (Vitamin B1) and choline chloride with high content in feed. Do not use with other anticoccidials.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 5 kg multilayer aluminium foil bag.

AMPROZAND-S

Amprolium 9.6%
(Oral Solution)



محلول خوراکی آمپرولیوم ۹/۶٪

آمپروزند - اس

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

موارد منع مصرف: مصرف این دارو در مرغ تخمگذار می تواند سبب افت تولید شود. همچنین از مصرف این دارو در مرغ تخمگذاری که تخم مرغ آن به مصرف انسان می رسد، خودداری شود.

موارد احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر ۲۴ ساعت پس از آماده سازی مصرف شود. از مصرف بیش از میزان توصیه شده اجتناب گردد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر از محلول آمپروزند - اس حاوی ۹۶ میلی گرم آمپرولیوم هیدروکلراید می باشد.

موارد مصرف: از آمپروزند - اس جهت درمان کوکسیدیوز در طیور گوشتی، پولت تخم گذار و بوقلمون، گوساله و بره استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۲۵۰ میلی لیتر آمپروزند - اس در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ تا ۷ روز (در موارد شدید شیوع بیماری ۵۰۰ میلی لیتر آمپروزند - اس در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی) سپس درمان را به میزان ۵۰۰ میلی لیتر آمپروزند - اس در ۸۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۱ تا ۲ هفته ادامه دهید.

گوساله و بره: ۲ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن زنده به مدت ۵ تا ۷ روز و در صورت نیاز به ادامه درمان، ۵ میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ هفته در طول دوره درمان باید تنها منبع آب آشامیدنی، آب حاوی دارو باشد.

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Amprozand-S contains 96 mg Amprolium (as Hydrochloride).

Indications: Amprozand-S is effective against other protozoal infections like Histomoniasis (Blackhead) in turkeys and poultry; against coccidiosis in calves and lambs; against amoebiasis in various species.

Dosage and administration:

For oral administration via feed or drinking water.

- Poultry: 250 ml per 200 liters of drinking water during 5 – 7 days. In acute cases, 500 ml per 200 liter of drinking water followed by 500 ml per 800 liters of drinking water during 1 or 2 weeks.
- Calves and lambs: 2 ml per 20 kg bodyweight as drench during 1 – 2 days, followed by 5 ml per 1 liter of drinking water during 3 weeks.

During treatment, only medicated drinking water should be administered.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: 3 days

Contra-indications: Use in laying hens may cause egg-drop. Do not use in layers producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

DICLAZAND

Diclazuril 0.5%
(Granulated Premix)



دیکلازاند

گرانول مخلوط در دان دیکلازوریل ۰.۵٪

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان دیکلازاند با تولترازوریل پرهیز شود.

هشدار: دیکلازاند را در شیوع ناگهانی بیماری استفاده نکنید.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های چند لایه آلومینیومی ۱ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم دیکلازاند حاوی ۵ میلی گرم دیکلازوریل است.

موارد مصرف: دیکلازاند جهت کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، پولت‌های تخم‌گذار و بوقلمون در حال رشد به کار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه‌های گوشتی و پولت‌های تخم‌گذار: ۲۰۰ گرم دیکلازاند در هر تن دان

بوقلمون‌ها: ۲۰۰ گرم دیکلازاند در هر تن دان

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of Diclazand contains 5 mg Diclazuril.

Indications: Diclazand is indicated for prevention and control of coccidiosis in broilers, layer pullets and turkeys.

Dosage and administration:

Broilers and layer pullets: 200 grams Diclazand per tonne of feed

Turkeys: 200 grams Diclazand per tonne of feed

-As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Broilers: 5 day.

Contra-indications: Concomitant therapy with Tultrazuril is not recommended.

Warning: Do not use Diclazand upon sudden start of the diseases.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 kg multilayer aluminium foil bag.

MADUCARBAZAND

Maduramicin 0.75% + Nicarbazin 8%
(Granulated Premix)



مادوکاربازند

گرانول مخلوط در دان مادوراماسین ۰.۷۵٪ + نیکاربازین ۸٪

ترکیب: هر گرم مادوکاربازند حاوی ۷/۵ میلی گرم مادوراماسین آمونیوم و ۸۰ میلی گرم نیکاربازین می باشد.

موارد مصرف: مادوکاربازند جهت پیشگیری و کنترل بیماری کوکسیدیوز در جوجه گوشتی و نیمچه تخمدار به کار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی و نیمچه تخمگذار: ۵۰۰ گرم مادوکاربازند در هر تن دان

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد منع مصرف: با سایر داروهای ضد کوکسیدیوز مصرف نشود. در طیور تخم گذار در دوره تولید مصرف نشود.

هشدار: با توجه به افزایش حساسیت پرنده به استرس گرمایی، مصرف این دارو در فصول گرم سال توصیه نمی گردد و در صورت تصمیم به استفاده، حتماً، زیر نظر دکتر دامپزشک مصرف گردد.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت های چند لایه آلومینیومی ۵ کیلوگرمی

Composition: Each gram of Maducarbazand contains 7.5 mg Maduramicin ammonium and 80mg Nicarbazin.

Indications: Maducarbazand is used in order to prevent and control of coccidiosis in broilers and layer pullets.

Dosage and administration:

Mix 500 g of Maducarbazand in one ton of complete feed from the first week of growing period till the end.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Nil

Contra-indications: Do not use with other coccidiostat additives in feed at the same time. Do not use in layers at the laying period.

Warning: Use of this product can increase the birds' sensitivity to the heat stress and therefor it is not recommended to use this product in hot weathers and if it is persisted, use it under veterinarian supervision.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 5 kg multilayer aluminium foil bag.

شرکت داروسازی فارمازند

MADURAZAND

Maduramicin Ammonium 1%
(Premix)



مادورازند

پودر مخلوط در دان مادورامایسین آمونیوم ۱٪

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: با سایر کوکسیدیواستات‌ها به طور همزمان مصرف نشود.

هشدار: فقط در جوجه‌های گوشتی مصرف شود. در اسب و سایر تک سمی‌ها سمی می‌باشد.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های چند لایه آلومینیومی ۵ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم مادورازند حاوی ۱۰ میلی گرم مادورامایسین آمونیوم می‌باشد.

موارد مصرف: مادورازند جهت کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی به کار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی: ۵۰۰ گرم مادورازند در هر تن دان

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of Madurazand contains 10 mg Maduramicin ammonium.

Indications: Madurazand is indicated for control and prevention of coccidiosis in broilers.

Dosage and administration:

Broilers: 500 grams per tonne of feed

-As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Broilers: 5 day.

Contra-indications: Do not use Madurazand while using other coccidiostats.

Warning: Use only in broilers. It is toxic for horse.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 kg multilayer aluminium foil bag.

MONENSOZAND

Monensin Sodium 10%
(Granulated Premix)



موننسوزند

گرانول مخلوط در دان موننسن سدیم ۱۰٪

زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان موننسوزند با تیامولین، فلورفنیکول، اریترومایسین و سولفانامیدها پرهیز شود.

هشدار: در مرغ تخمگذار مصرف نشود. از مصرف موننسوزند در جیره غذایی اسب و سایر تک سمی‌ها خودداری شود.

موارد احتیاط: موننسوزند نباید با سایر کوکسیدیواستات‌ها مخلوط شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های چند لایه آلومینیومی ۵ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم موننسوزند حاوی ۱۰۰ میلی گرم موننسن سدیم می‌باشد.

موارد مصرف: موننسوزند جهت کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، پولت‌های تخمگذار و بوقلمون‌ها به کار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه‌های گوشتی، پولت‌های تخمگذار و بوقلمون: یک کیلوگرم موننسوزند در هر تن دان - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of Monensozand contains 100 mg Monensin Sodium.

Indications: Monensozand is indicated for control and prevention of coccidiosis in broiler, layer pullet and turkey.

Dosage and administration:

Broiler, layer pullet and turkey: 1 kg Monensozand per tonne of feed

-As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Broilers: 3 day.

Contra-indications: Do not use Monensozand while using Tiamulin, Florfenicol, Erythromycin and Sulfonamides.

Warning: Do not feed to laying hens in production. Do not feed to horse.

Precautions: Do not mix with other coccidiostats. Keep out of reach of children.

Presentation: 5 kg multilayer aluminium foil bag.

شرکت داروسازی فارمازند

SALINOZAND

Salinomycin Sodium 12%
(Granulated Premix)



سالی‌نوزند

گرانول مخلوط در دان سالی‌نومايسين سدیم ۱۲٪

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان سالی‌نوزند با ماکرولیدها از جمله تیامولین پرهیز شود. سالی‌نوزند همراه با سایر کوکسیدیواستات‌ها مصرف نشود.

هشدار: در مرغ تخمگذار در حین تولید مصرف نشود. در اسب و سایر تک سمی‌ها سمی می‌باشد.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های چند لایه آلومینیومی ۵ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم سالی‌نوزند حاوی ۱۲۰ میلی گرم سالی‌نومايسين سدیم است.

موارد مصرف: سالی‌نوزند جهت کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های تخمگذار به کار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف:

جوجه‌های گوشتی: ۵۰۰ گرم سالی‌نوزند در هر تن دان
پولت‌های تخمگذار: ۳۵۰ تا ۵۰۰ گرم سالی‌نوزند در هر تن دان
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of Salinozand contains 120 mg Salinomycin sodium.

Indications: Salinozand is indicated for control and prevention of coccidiosis in broilers and layer pullets.

Dosage and administration:

Broilers: 500 grams Salinozand per tonne of feed

Layer pullets: 350-500 grams Salinozand per tonne of feed

-As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Broilers: 5 day.

Contra-indications: Do not use Salinozand while using Tiamulin or other coccidiostats.

Warning: Do not feed to laying hens in production. It is toxic for horse.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 5 kg multilayer aluminium foil bag.

TOLTRAZAND

Toltrazuril 2.5%
(Oral Solution)



تولترازند

محلول خوراکی تولترازوریل ۲/۵٪

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

تداخلات دارویی: این دارو با هیچ دارویی تداخل ندارد.

زمان پرهیز از مصرف: این دارو باید ۱۴ روز قبل از ارسال به کشتارگاه حذف شود.

موارد منع مصرف: این دارو نباید در مرغ تخم گذار که تخم مرغ آن به مصرف انسان میرسد، مصرف گردد.

موارد احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر ۲۴ ساعت پس از آماده سازی مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر محلول خوراکی تولترازند حاوی ۲۵ میلی گرم تولترازوریل می باشد.

موارد مصرف: تولترازوریل یک داروی ضدکوکسیدیوز وسیع الطیف می باشد که برای درمان تمامی موارد آیمیریا در مرغ و بوقلمون شامل آیمیریاهای مرغ نظیر آیمیریا تنلا، آیمیریا ماکزیمیا، آیمیریا آسرولینا، آیمیریا نکاتریکس و آیمیریاهای بوقلمون نظیر آیمیریا مله اگریدیس و آیمیریا آدنوئیدس مورد استفاده قرار میگیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: دوز پایه این محصول ۷ میلی گرم تولترازوریل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پرنده می باشد که بطور تقریبی معادل ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی، به مدت ۴۸ ساعت بطور مداوم مصرف گردد. همچنین می توان از این محصول به میزان ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی، ۸ ساعت در روز، به مدت ۴۸ ساعت استفاده کرد.

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Toltrazand contains 25 mg of Toltrazuril.

Indications: Toltrazand is indicated for the treatment of coccidiosis caused by different species of Eimeria: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, and E. tenella in chicken and E. adenoides, E. meleagridis and E. meleagrimitis in turkeys.

Dosage and administration:

Poultry: 7 mg Toltrazand per Kg/BW equivalent to 1 liter of Toltrazand in 1000 liters of drinking water, for 48 hours continuously or 3 liters of Toltrazand in 1000 liters of drinking water for 8 hours, each day, during continuous 48 hours.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: 14 days in broilers

Contra-indications: None

Precautions: Medicated water is better to use after 24 hour preparation. Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

SUPPORTIVES

-  ASPIRAZAND
-  BETA POWERZAND
-  BRONCOZAND
-  CALMOZAND
-  ORSOZAND
-  PARAFFIN

ASPIRAZAND

Aspirin + Vitamin C
(W.S.P)



آسپیرازند

پودر محلول در آب آسپرین + ویتامین C

زمان پرهیز از مصرف: ۲ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان آسپیرازند با سولفانامیدها پرهیز شود.

موارد احتیاط: قبل از مصرف، بسته رطوبت گیر از داخل پاکت خارج گردد. آب حاوی دارو حداکثر ۱۸ ساعت پس از تهیه مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت‌های چند لایه آلومینیومی ۱ کیلوگرمی

ترکیب: هر گرم آسپیرازند، حاوی ۲۰ میلی گرم آسکوربیک اسید (ویتامین C) و ۲۵۰ میلی گرم استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین) است.

موارد مصرف: آسپیرازند در هنگام بروز بیماری‌های تب دار نظیر CRD، نیوکاسل، کلی باسیلوز، آنفلوانزا و همچنین در موارد استرس‌های حمل و نقل، گرمایی و واکسیناسیون توصیه می‌گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱ کیلوگرم آسپیرازند در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی - یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

Composition: Each gram of Aspirazand contains 20 mg Ascorbic acid (vitamin C) and 250 mg Acetyl salicylic acid (Aspirin).

Indications: Aspirazand is indicated for pyrogenic disease including Newcastle disease, Colibacillosis, CRD, Avian Influenza and for stressful conditions such as transportation, heat stress and vaccination.

Dosage and administration:

Poultry: 1 kg Aspirazand in 1000 liters of drinking water.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time:

Poultry: 2 days

Contra-indications: Concomitant therapy with Sulfonamides is not recommended.

Precaution: Remove the medicated water after 18 hours. Keep out of reach of children.

Presentation: 1 kg multilayer aluminium foil bag.

شرکت داروسازی فارمازند

BETA POWERZAND

Glucose + Betaine + Electrolyte
(Oral Solution)



بتاپاورزند

محلول خوراکی گلوکز + بتائین + الکترولیت

ترکیب: هر میلی لیتر محلول بتاپاورزند حاوی:

گلوکز	۵۵۰ میلی گرم
بتائین	۴۰ میلی گرم
فسفر	۱۲ میلی گرم
سدیم	۳۹ میلی گرم
پتاسیم	۱۴ میلی گرم

موارد مصرف:

- جهت تحریک اشتها
- جهت کاهش تلفات اولیه جوجه‌ها در روزهای اول دوره پرورش
- جهت ارتقاء عملکرد گله نظیر افزایش وزن‌گیری، کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش تولید تخم مرغ
- در هنگام استرس گرمایی، واکسیناسیون و حمل و نقل
- به دنبال درمان‌های آنتی بیوتیکی در دوره نقاهت بیماری‌ها

مقدار و نحوه مصرف: ۰/۵ تا ۱ لیتر بتاپاورزند در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد منع مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر ۱۲ ساعت پس از آماده سازی مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

Composition: Each milliliter of Betapowerzand contains:

Glucose	550 mg
Betaine	40 mg
Phosphorus	12 mg
Sodium	39 mg
Potassium	14 mg

Indications: Betapowerzand is indicated for:

- As appetite stimulant to increase feed consumption
- To decrease early mortality in first week of growing period
- To improve flock performance such as increasing weight gain, decreasing FCR and increasing egg production
- To control adverse effects of vaccination and any environmental stress such as Heat stress and transportation
- After antibiotic therapy to rebuilt flock condition

Dosage and administration:

0.5 to 1 liter of Betapowerzand in 1000 liters of drinking water.

- As directed by veterinarian

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: Nil

Contra-indications: Nil

Precaution: Medicated water is better to use after 12 hours preparation. Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

BRONCOZAND

Bromhexine 1%
(Oral Solution)



برونکوزند

محلول خوراکی برم هگزین ۱٪

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۲ روز

موارد منع مصرف: ندارد

هشدار: در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی لیتر برونکوزند حاوی ۱۰ میلی گرم برم هگزین به صورت ملح هیدروکلراید می باشد.

موارد مصرف: برونکوزند جهت درمان حمایتی بیماری های تنفسی مانند برونشیت عفونی، آنفلوآنزا، CRD، لارینگوتراکئیت و کوریزای عفونی در طیور استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر برونکوزند در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Broncozand contains 10 mg Bromhexine (as Hydrochloride).

Indications: Broncozand is indicated for supportive treatment of respiratory diseases such as Infectious Bronchitis, Avian Influenza, CRD, Infectious Laryngotracheitis, Infectious Coryza in poultry.

Dosage and administration:

Poultry: 1 liter of Broncozand in 1000 liters of drinking water for 3 to 5 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Poultry: 2 days

Contra-indications: Nil

Warning: Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

CALMOZAND

Ca+Mg+D3
(Oral Solution)



کالموزند

محلول خوراکی کلسیم + منیزیم + ویتامین D3

ترکیب: هر میلی لیتر کالموزند حاوی:

کلسیم کلراید دو آبه	۴۰۶ میلی گرم
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول)	۲۰۰ واحد بین المللی
منیزیم کلراید شش آبه	۱۶ میلی گرم

آمادگی جهت شیرواری: ۲ لیتر کالموزند قبل از زایمان به هر گاو خورانده شود و به فاصله ۱۲ و ۲۴ ساعت تکرار گردد.
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

موارد منع مصرف: ندارد

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۱ لیتری

موارد مصرف: کالموزند برای پیشگیری و درمان حمایتی هیپوکلسمی و تب شیر و همچنین جهت آمادگی دام برای دوره شیرواری مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو:

پیشگیری از تب شیر: ۱ تا ۲ لیتر کالموزند به هر گاو خورانده شود و به فاصله ۱۲ ساعت تکرار گردد.
درمان حمایتی تب شیر: ۱ لیتر کالموزند به هر گاو خورانده شود و به فاصله ۱۲ و ۲۴ ساعت تکرار گردد.

Composition: Each milliliter of Calmozand contains:

Calcium chloride dihydrate	406 mg
Vitamin D3 (Cholecalciferol)	200 I.U.
Magnesium chloride hexahydrate	16 mg

Indications: Calmozand is indicated for prevention and supportive treatment of hypocalcemia and milk fever. It is also indicated before lactation stage.

Dosage and administration:

Cow:

Prevention of milk fever: 1 to 2 liters Calmozand per case and repeat after 12 hours.

Supportive treatment of milk fever: 1 liter Calmozand per case and repeat after 12 and 24 hours.

Before lactation stage: 2 liters Calmozand per case before parturition and repeat after 12 and 24 hours.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Nil

Contra-indications: Nil

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

ORSOZAND

Oral Rehydration Salts
(W.S.P)



اورسوزند

پودر محلول در آب او-آر-اس

ترکیب: هر ساشه صد گرمی اورسوزند حاوی:

کلرید سدیم	۱۴۵۰۰ میلی گرم
کلرید پتاسیم	۴۰۰۰ میلی گرم
تری سدیم سیترات	۱۶۵۰۰ میلی گرم
دکستروز	۶۵۰۰۰ میلی گرم

شرایط نگهداری: در مکان خشک، دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

موارد احتیاط: در موارد انسداد معده و روده و یا در موارد اسهال شدید لازم است که مایعات و الکترولیت‌های از دست رفته بصورت تریقی جایگزین شوند. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه‌های چند لایه آلومینیومی ۱۰۰ گرمی

موارد مصرف: اورسوزند جهت اصلاح بالانس الکترولیتی و ایجاد تعادل اسید و باز در بدن استفاده می‌گردد. اورسوزند را می‌توان جهت پیشگیری و درمان دهیدراتاسیون ناشی از اسهال در گوساله، بره و بزغاله بکار برد.

مقدار و نحوه مصرف:

۲۵ گرم اورسوزند را در یک لیتر آب آشامیدنی حل کرده و متناسب با وزن دام ۱ تا ۱/۵ لیتر، سه نوبت در روز و بمدت ۳ تا ۴ روز مصرف شود.
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each sachet of Orsozand contains:

Sodium chloride	14500 mg
Potassium chloride	4000 mg
Trisodium citrate	16500 mg
Dextrose	65000 mg

Indications: The Sodium chloride and Potassium chloride can be used for recovery of electrolyte and acid/base imbalances. Orsozand is indicated for prevention and treatment of dehydration caused by diarrhea in calf, kid and lamb.

Dosage and administration:

Dissolve 25 grams Orsozand in one liter of drinking water and the amount of 1 to 1.5 liter of this solution should be administered orally three times a day for 3 to 4 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep in dry place and away from direct light. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Nil

Precautions: In gastric or intestinal obstruction or when diarrhea is severe, it is necessary to replace lost fluids and electrolytes by the parenteral administration. Keep out of reach of children.

Presentation: 100 grams multilayer aluminium foil sachets.

PARAFFIN

Oral Paraffin
(Oral Solution)



پارافین

محلول خوراکی پارافین

*در صورت لزوم بهتر است مقادیر فوق در ۲ تا ۳ نوبت در طی روز مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

تداخل دارویی: در صورت استفاده دراز مدت ممکن است باعث ایجاد اختلالات گوارشی از جمله اختلال در جذب مواد مغذی شود.

موارد احتیاط: مقادیر درمانی توصیه شده بهتر است توسط لوله معدی خورنده شود تا از بروز احتمالی پنومونی استنشاقی جلوگیری بعمل آید. این دارو بی رنگ بوده و در صورت مشاهده تغییر رنگ از مصرف آن خودداری شود. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده خودداری شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر بطری حاوی پارافین خوراکی دارویی مطابق با استاندارد USP-BP می باشد.

موارد مصرف: این دارو به عنوان ملین و نرم کننده مدفوع در انواع اختلالات دستگاه گوارش از جمله انباشتگی ها، سوء هاضمه، یبوست و نفخ و همچنین کولیک اسب بکار می رود. پارافین از طریق کاهش کشش سطحی محتویات شکمبه، بعنوان ضد نفخ در نشخوار کنندگان نیز بکار می رود.

مقدار و نحوه مصرف:

اسب و گاو: ۱ تا ۴ لیتر خوراکی
گوساله و کره اسب: ۶۰ تا ۱۲۰ میلی لیتر خوراکی و ۵۰ تا ۶۰ میلی لیتر رکتال جهت دفع مکونیوم
گوسفند و بز: ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر خوراکی یا ۵ تا ۱۰ میلی لیتر رکتال جهت دفع مکونیوم بره ها
سگ: ۲ تا ۶۰ میلی لیتر خوراکی
گربه: ۲ تا ۲۰ میلی لیتر خوراکی

Composition: Each bottle contains edible medicinal paraffin according to the standards of USP-BP

Indications: Paraffin is used as a laxative and emollient in some gastrointestinal disorders like as impactions, malabsorption, constipation, bloating and equine sand colic. Paraffin decreases surface tension of the ruminal content then can be applied as anti bloating agent in the ruminants.

Dosage and administration:

Horses and Cows: 1 to 4 liters oral intake

Calves and Foals :60 to 120 ml. oral intake and 50 to 60 ml. rectal intake to pass down Meconium.

Goats and sheep: 100 to 500 ml. oral intake or 5 to 10 ml. rectal intake to pass down Meconium.

Dogs : 2 to 60 ml. oral intake.

Cats : 2 to 20 ml. oral intake.

It is preferable to divide and administer abovementioned dosages in two or three times per day.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal Time: Nil

Contra-indications: to avoid aspirational pneumonia use a gastrostomy tube. This medicine is colorless , do not use if there has been a change. Do not over dose.

Warning: In case of prolonged usage might cause digestive irregularities including inability to absorb nutritionals.

Precautions: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.

ANTHELMINTIC

-  LEVOZAND 7.5
-  LEVOZAND 10

LEVOZAND 7.5

Levamisole Hydrochloride 7.5%
(Oral Solution)



لووزند ۷/۵

محلول خوراکی لوامیزول هیدروکلراید ۷/۵٪

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت گوسفند و گاو: ۱۴ روز

گوشت مرغ: ۱۰ روز

شیر: ۳ روز

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان لووزند ۷/۵ با فلورفنیکل، پیرانتل و ارگانوفسفره‌ها پرهیز شود.

هشدار: در دام‌هایی که شیر آنها به مصرف انسان می‌رسد مصرف نشود. در صورت مصرف بیش از حد لووزند ۷/۵، ممکن است علائمی چون دردهای عضلانی، تکان دادن سر و افزایش ترشح بزاق بروز پیدا کند.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی‌لیتر لووزند ۷/۵ حاوی ۷۵ میلی‌گرم لوامیزول هیدروکلراید است.

موارد مصرف: لووزند ۷/۵ یک ضد انگل وسیع الطیف برای پیشگیری و درمان عفونت‌های نماتودی ریوی و گوارشی در گوسفند، بز و طیور می‌باشد. این دارو همچنین به عنوان محرک سیستم ایمنی نیز شناخته شده است.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو، گوسفند و بز: ۱/۲۵ میلی‌لیتر لووزند ۷/۵ برای ۱۵ کیلوگرم وزن بدن
طیور:

جهت کنترل و درمان عفونت‌های نماتودی: ۱۲۵۰ میلی‌لیتر لووزند ۷/۵ در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۱ روز و تکرار بعد از ۲۱ روز

جهت تحریک سیستم ایمنی: ۱۲۵۰ میلی‌لیتر لووزند ۷/۵ در ۳۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز و پس از ۳ روز وقفه، ۳ روز دیگر تکرار شود.

- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Levozand 7.5 contains 75 mg Levamisole Hydrochloride.

Indications: Levozand 7.5 is indicated for control and treatment of gastrointestinal and pulmonary nematode infestations in sheep, goat and poultry. Levozand 7.5 is also known as immunostimulant in poultry.

Dosage and administration:

Cow, Sheep and goat: 1.25 ml Levozand 7.5 per 15 kg body weight.

Poultry:

Control and treatment of nematode infestations: 1250 ml Levozand 7.5 in 1000 liters of drinking water for 1 day and repeat after 21 days.

As an immunostimulant: 1250 ml Levozand 7.5 in 3000 liters of drinking water for 3 days.

Repeat it after 3 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time:

Meat: 21days

Milk: 3 days

Contra-indications: Do not use Levozand while using Florfenicol, Pyrantel and Organophosphates.

Warning: Not to be used in animal producing milk for human consumption. Avoid overdosing.

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.



LEVOZAND 10

Levamisole Hydrochloride 10%
(Oral Solution)

لووزند ۱۰

محلول خوراکی لوامیزول هیدروکلراید ۱۰٪

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

زمان پرهیز از مصرف:
گوشت گوسفند و گاو: ۱۴ روز
گوشت مرغ: ۱۰ روز
شیر: ۳ روز

موارد منع مصرف: از مصرف همزمان لووزند ۱۰ با فلورفنیکل، پیرانتل و ارگانوفسفره‌ها پرهیز شود.

هشدار: در دام‌هایی که شیر آنها به مصرف انسان می‌رسد، مصرف نشود. در صورت مصرف بیش از حد لووزند، ممکن است علائمی چون دردهای عضلانی، تکان دادن سر و افزایش ترشح بزاق بروز پیدا کند.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: بطری‌های پلی اتیلنی ۱ لیتری

ترکیب: هر میلی‌لیتر لووزند ۱۰ حاوی ۱۰۰ میلی‌گرم لوامیزول هیدروکلراید است.

موارد مصرف: لووزند ۱۰ یک ضد انگل وسیع الطیف برای کنترل و درمان عفونت‌های نماتودی گوارشی و ریوی در گوسفند، بز و طیور می‌باشد. این دارو همچنین به عنوان محرک سیستم ایمنی در طیور شناخته شده است.

مقدار و نحوه مصرف:

گوسفند و بز: ۱ میلی‌لیتر لووزند ۱۰ برای ۱۵ کیلوگرم وزن بدن طیور:

جهت کنترل و درمان عفونت‌های نماتودی: ۱ لیتر لووزند ۱۰ در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۱ روز و تکرار بعد از ۲۱ روز جهت تحریک سیستم ایمنی: ۱ لیتر لووزند ۱۰ در ۳۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز مصرف شود.

پس از ۳ روز وقفه، ۳ روز دیگر تکرار شود.
- یا طبق نظر دکتر دامپزشک

Composition: Each milliliter of Levozand10 contains 100 mg Levamisole Hydrochloride.

Indications: Levozand 10 is indicated for control and treatment of gastrointestinal and pulmonary nematode infestations in sheep, goat and poultry. Levozand 10 is also known as immunostimulant in poultry.

Dosage and administration:

Sheep and goat: 1 ml Levozand 10 per 15 kg body weight.

Poultry:

Control and treatment of nematode infestations: 1 liter Levozand 10 in 1000 liters of drinking water for 1 day and repeat after 21 days.

As immunostimulant: 1 liter Levozand 10 in 3000 liters of drinking water for 3 days.

Repeat it after 3 days.

- As directed by veterinarian.

Storage: Store below 25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time:

Sheep: 21days

Contra-indications: Do not use Levozand while using Florfenicol, Pyrantel and Organophosphates.

Warning: Not to be used in animal producing milk for human consumption. Avoid overdosing.

Precaution: Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.



PHARMAZAND

Pharmaceutical Co.



www.PHARMAZAND.com

info@PHARMAZAND.com

آدرس کارخانه: کرج، محمدشهر

زیبادشت، خیابان صنعت ششم

تلفن واحد فروش: ۳۰-۳۶۳۰۷۰۲۸ (۰۲۶)